

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

**Ambrobene 75 mg**  
**tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním**  
(Ambroxoli hydrochloridum)

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je **Ambrobene 75 mg** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **Ambrobene 75 mg** užívat
3. Jak se **Ambrobene 75 mg** užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak **Ambrobene 75 mg** uchovávat
6. Další informace

**1. CO JE Ambrobene 75 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Ambroxol, léčivá látka přípravku **Ambrobene 75 mg**, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působením usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.

**Ambrobene 75 mg** se užívá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest, při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.

Přípravek **Ambrobene 75 mg** je určen pro děti starší 12 let, mladistvé a dospělé.

**2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Ambrobene 75 mg UŽÍVAT**

**Neužívejte Ambrobene 75 mg**

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku.

**Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ambrobene 75 mg je zapotřebí**

- při porušené bronchomotorice a větším nahromadění hlenu;
- jestliže máte akutní vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku;
- při omezené funkci ledvin nebo při těžkém onemocnění jater.

**Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

S přípravkem **Ambrobene 75 mg** se mohou ovlivňovat následující léky:

- antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erytromycin, doxycyklin;
- látky tlumící kašel, např. kodein.

**Užívání přípravku Ambrobene 75 mg s jídlem a pitím**