

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lopacut 2 mg **potahované tablety** loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Lopacut musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

1. Co je Lopacut a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lopacut užívat
3. Jak se Lopacut užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Lopacut uchovávat
6. Další informace

1. CO JE LOPACUT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Lopacut obsahuje loperamid- hydrochlorid . Patří do skupiny protiprůjmových léků.

Lopacut se používá:

- k úlevě od příznaků náhlého, krátkodobého průjmu (akutní průjem) u dospělých a dospívajících starších 12 let.

Lopacut zahušťuje stolicí a snižuje její častost.

Lékař může tento přípravek předepsat i pro jiné účely.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LOPACUT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lopacut

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na loperamid nebo na kteroukoli další složku přípravku Lopacut,
- jestliže máte ve stolici krev nebo trpíte průjmem s vysokými horečkami,
- jestliže trpíte zánětem tlustého střeva (*colitis ulcerosa* nebo *pseudomembranózní kolitida* po užívání antibiotik),
- jestliže trpíte enterokolitidou zapříčiněnou invazivním organismem, jako je *Salmonella*, *Shigella* a *Campylobacter*
- pokud je postup potravy střevem již tak pomalý, *např.* pokud máte zácpu nebo máte vzduté břicho,
- jestliže trpíte dlouhodobým průjmem (chronický průjem).