

Přední panel

Terapeutická tekutá strava

Potravina pro zvláštní lékařské účely

K modulaci zánětu při sepsi, ALI nebo ARDS

Klinicky prokázané snížení počtu dnů na umělé plicní ventilaci a pobytu na JIP.

1,5 kcal/ml
e 500 ml

Zadní panel

Určeno k dietnímu postupu při péči o uměle ventilované pacienty, zejména ty, kteří trpí sepsí, akutním plicním selháním (ALI) nebo syndromem akutní respirační tísně (ARDS). **Oxepa** je vysoce kalorická tekutá strava pro enterální výživu s nízkým obsahem sacharidů. Obsahuje specifickou patentovanou olejovou směs, kyselinu gamolenovou, EPA* a zvýšené množství antioxidantů. Obsah specifických živin je upraven tak, aby pokryl potřeby těchto pacientů: zvýšené množství vitamínů E a C. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** **Oxepa** je vhodná jako jediný nebo doplňkový zdroj výživy. Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Není určeno pro děti, pokud to nedoporučí lékař nebo osoba kvalifikovaná v oblasti výživy. Neužívat při galaktosémii. Nepodávat parenterálně. Není určeno k nitrožilnímu podání. Neobsahuje lepek.

NÁVOD K POUŽITÍ: PŘED OTEVŘENÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE. Neotevřenou výživu uchovávejte při pokojové teplotě.

Podávání sondou: Průtok a množství výživy při podávání sondou závisí na stavu a toleranci pacienta. Dodatečnou potřebu tekutin lze pokrýt podáním vody.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci přípravku při jeho přípravě a podání.

Výživu napojenou na enterální set znehodnoťte do 24 hodin od napojení.

* kyselina eikosapentaenová, omega-3 mastná kyselina získaná z oleje mořských ryb

BALENÉ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE

Nutriční informace		ve 100 ml	v 500 ml
Energetická hodnota	kcal	152	759
	kJ	633	3166
Bílkoviny	g	6,25	31,25
Sacharidy	g	10,6	53,0
z toho cukry	g	5,84	29,2
Tuky	g	9,37	46,85
z toho nasycené	g	3,05	15,25
Voda	g	78,6	393
Taurin	mg	32	160
Karnitin	mg	12	60
Vitamíny			
Vitamín A (palmitan)	µg RE	158	792