

Příbalová informace: informace pro pacienta

Prostamol UNO 320 mg, měkké tobolky Serenoa extractum (serenoový extrakt)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Prostamol UNO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat
3. Jak se Prostamol UNO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prostamol UNO uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Prostamol UNO a k čemu se používá

Prostamol UNO obsahuje Serenoae extractum 320 mg (serenoový extrakt). Prostamol UNO je rostlinný přípravek určený k léčbě potíží s prostatou (urologikum).

Prostamol UNO je určen mužům trpícím poruchami močení při nezhooubném zbytnění prostaty (benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stádiu tohoto onemocnění.

Klasifikace stádií benigní hyperplazie prostaty:

Stádium	Název	Příznaky
I	Stádium dráždění (iritace)	<ul style="list-style-type: none">- Obtížné a bolestivé močení (bolest za stydkou sponou)- Zpomalené zahájení močení- Prodloužené a přerušované močení- Slabý proud moči- Časté močení (zejména během noci)- Únik moči (inkontinence)- Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře.
II	Stádium zbytkové (reziduální) moči	<ul style="list-style-type: none">- Obtíže s močením přetrvávají- Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a zůstává v něm i po vymočení tzv. zbytková (reziduální) moč- Pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře.
III	Stádium dekompenzace	<ul style="list-style-type: none">- "Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání moči způsobené přeplněným močovým měchýřem)