

## Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29145/2012

### PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

#### NÁZEV PŘÍPRAVKU

Šalvějová nat'

Salviae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

#### SLOŽENÍ

Salviae herba 30 g

#### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný *vnitřně*: mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné pocení

*Zevně*: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

#### PŘÍPRAVA

*Vnitřně*: *při zažívacích obtížích*: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*k omezení nadměrného pocení*: 1 polévková lžice se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*zevně*: 1 polévková lžice drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použije 1 polévková lžice na 120 ml vroucí vody.*

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, porad'te se s lékařem.

#### KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

#### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřídte ani neobsluhujte stroje.