

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

### Stacyl 100 mg enterosolventní tablety acidum acetylsalicylicum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.** Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Stacyl 100 mg musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je přípravek **Stacyl** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek **Stacyl** užívat
3. Jak se přípravek **Stacyl** užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek **Stacyl** uchovávat
6. Další informace

#### **1. CO JE PŘÍPRAVEK STACYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Přípravek **Stacyl** obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která v nízkých dávkách patří do skupiny léčiv zvaných protidestičkové látky (tlumí shlukování krevních destiček). Krevní destičky (trombocyty) jsou malá krevní tělíčka, která způsobují, že se krev sráží a účastní se tak při vzniku trombózy (vzniku krevních sraženin v cévách). Když vznikne krevní sraženina (trombus) v tepně, zastaví průtok krve a přeruší přísun kyslíku. Pokud toto nastane v srdci, může to vyvolat srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo záchvat anginy pectoris; v mozku to může způsobit cévní mozkovou příhodu.

Přípravek **Stacyl** se užívá ke snížení rizika tvorby krevních sraženin a tím k předcházení dalších:

- infarktů myokardu
- cévních mozkových příhod
- srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ záchvatovitě bolesti na hrudníku).

Přípravek **Stacyl** se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních operací k rozšíření a uvolnění krevních cév.

Tento léčivý přípravek není určen pro použití při akutních stavech. Používá se pouze jako léčba preventivní.