

**Příbalová informace: informace pro uživatele**

**STOPTUSSIN**

Perorální kapky, roztok.  
(Butamirati citras , guaifenesinum )

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci :**

1. Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat
3. Jak se přípravek STOPTUSSIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek STOPTUSSIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace

**1. Co je přípravek STOPTUSSIN a k čemu se používá**

Přípravek Stoptussin tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.

Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětu hrtanu, průdušek a plic. Na doporučení lékaře lze přípravek Stoptussin podat i k utišení kašle před a po operaci, u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku.

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STOPTUSSIN užívat**

**Neužívejte přípravek Stoptussin**

- jestliže jste alergický(á) na guaifenesin, butamirát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
- v prvních třech měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody.
- u dětí mladších 6 měsíců.

**Upozornění a opatření**

Před užitím přípravku STOPTUSSIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.