

sp.zn. sukls209042/2013

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Talcid

(Hydrotalcitum)

žvýkáci tablety

Výrobce

Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer s.r.o, Praha, Česká republika

Složení

1 žvýkáci tableta obsahuje:

Léčivou látku: Hydrotalcitum 500 mg

Pomocné látky: mannitol, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, sodná sůl sacharinu, aroma máty pepřné, banánové aroma.

Indikační skupina

Antacidum

Charakteristika

Talcid žvýkáci tablety účinkují rychlým zlepšením a úlevou při zánětech žaludeční sliznice, žaludečních a dvanáctíkových vředech, zánětech jícnu, při pálení žáhy, při pocitu plnosti a bolesti v nadbříšku tím, že

- rychle a dlouhodobě neutralizují žaludeční kyselinu
- váží pepsin a žaludek poškozující žlučové kyseliny
- posilují faktory chránící žaludeční sliznici

Talcid působí přímo v místě bolesti a nevstřebává se do krevního oběhu.

Indikace

Přípravek se užívá u dospělých a dětí od 12ti let k léčení příznaků pálení žáhy, pocitu plnosti a bolesti v nadbříšku a na doporučení lékaře při akutních a chronických zánětech žaludeční sliznice (gastritida), při žaludečních a dvanáctíkových vředech, při zánětech jícnu.

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Myasthenia gravis (svalová slabost).

Závažné postižení ledvin.

Hypofosfatémie (nízká hladina fosfátů v krvi).

U nemocných se zhoršenou funkcí ledvin nebo u pacientů, kteří jsou na nízkofosfátové dietě, u pacientů s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence je třeba opatrnosti v dávkování a délce podávání. V tomto případě se poradte se svým lékařem.