

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Traumeel, tablety

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek **Traumeel** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek **Traumeel** používat
3. Jak se přípravek **Traumeel** používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek **Traumeel** uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK Traumeel A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kombinovaný přípravek **Traumeel** je homeopatická specialita.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Traumeel POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Traumeel:

- Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- **Traumeel** tablety nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na: *Arnica montana* (Prha arnika), *Calendula* (Měsíček), *Achillea* (řebříček), *Chamomilla* (heřmánek) a další složky tohoto přípravku.
- Na základě obecných znalostí o působení složky *Echinacea* nesmí být *Echinacea* používána u progresivního systémového onemocnění, jako je tuberkulóza, leukémie nebo onemocnění podobné leukémii, zánětlivé onemocnění pojivové tkáně (kolagen), autoimunitní onemocnění, roztroušená skleróza, příznaky související s AIDS, infekce HIV nebo jiné virové onemocnění.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku **Traumeel** se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem.