

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

### **Ataralgin** tablety

Paracetamolum, Guai-fenesinum, Coffeinum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.** Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však **Ataralgin** musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**V této písemné informaci pro uživatele naleznete:**

1. Co je **Ataralgin** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **Ataralgin** užívat
3. Jak se **Ataralgin** užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak **Ataralgin** uchovávat
6. Další informace

#### **1. CO JE ATARALGIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Ataralgin je složený přípravek s protibolestivým účinkem obsahující paracetamol, guaifenezin a kofein.

Paracetamol působí proti bolesti a snižuje horečku.

Guaifenezin zvyšuje protibolestivé účinky paracetamolu. Mimoto snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání.

Kofein zesiluje protibolestivé účinky, zejména u bolestí hlavy, odstraňuje únavu a zvyšuje duševní aktivitu.

Protibolestivý účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

Ataralgin se používá u dospělých k rychlému tlumení mírné až středně silné bolesti hlavy, zubů a bolesti v oblasti krční páteře. Dále se užívá při bolestech kloubů a svalů doprovázejících chřipková onemocnění, k léčbě horečnatých stavů při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. Přípravek není vhodný pro děti a mladistvé do 15 let.

#### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ATARALGIN UŽÍVAT**

**Neužívejte Ataralgin**

- jste-li alergický (přecitlivělý) na léčivé látky (paracetamol, guaifenezin, kofein) nebo na kteroukoli další složku **Ataralginu**