

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE - VP.

### Informace pro použití, čtěte pozorně!

#### **Betadine**

(povidonum iodinum)

mast

#### **Držitel rozhodnutí o registraci**

EGIS PHARMACEUTICALS PLC, BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO.

#### **Výrobce**

EGIS Pharmaceuticals PLC, Mátyás király utca 65., H-9900 Körmend, Maďarsko

ve spolupráci s firmou Mundipharma A.G., Basilej, Švýcarsko.

#### **1. Co obsahuje tento lék?**

V 1 gramu masti je obsaženo 100 mg léčivé látky povidonum iodinum (jodovaný povidon), což odpovídá 10 mg aktivního jodu. Přípravek obsahuje také hydrogenuhličitan sodný, makrogol 400, makrogol 1000, makrogol 1500, makrogol 4000 a čištěnou vodu.

Mast Betadine je antiseptický, desinfekční přípravek se širokým spektrem účinku proti bakteriím, virům, plísním a prvokům.

Přípravek se používá na popáleniny, řezné a tržné rány, odřeniny, vředová onemocnění kůže způsobená špatnou výživou tkáně (např. proleženiny, bércový vřed) a různá kožní onemocnění spojená s infekcí.

#### **2. Kdy se nemá používat mast Betadine**

Než začnete používat tuto mast, zodpovězte si následující otázky.

- Vyskytla se u Vás někdy v minulosti závažná alergická kožní reakce (např. vyrážka, svědění) po použití jiné masti nebo přípravku obsahujícího jod nebo některou z výše uvedených složek přípravku?
- Trpíte nějakým onemocněním štítné žlázy?
- Máte zánět kůže provázený výsevem puchýřků (tzv. dermatitis herpetiformis Duhring)?
- Podstupujete zvláštní léčbu radioaktivním jodem? Bude Vám provedeno vyšetření za použití radioaktivního jodu?
- Jste těhotná, plánujete otěhotnění nebo kojíte?

Pokud odpovíte na některou z výše uvedených otázek „ano“, pak mast Betadine na svou pokožku NENANÁŠEJTE. V případě, že neznáte přesně svůj zdravotní stav nebo předchozí onemocnění, poraďte se se svým lékařem.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů smí lékař předepsat přípravek (po zvážení poměru rizika a prospěchu) těhotným ženám od 4. měsíce těhotenství, kojícím ženám a dětem ve věku do 6 měsíců.

#### **3. Upozornění před zahájením léčby**

Informujte svého lékaře o tom, jestli:

- jste přecitlivělí na jod, makrogoly nebo jiné látky obsažené v přípravku,
- trpíte nějakým onemocněním štítné žlázy,
- máte kožní onemocnění provázené výsevem puchýřků (tzv. dermatitis herpetiformis Duhring),
- jste těhotná nebo kojíte.