

## **PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE**

### **CANDIBENE 1% SPRAY**

**kožní sprej, roztok**

(Clotrimazolum)

#### **Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.**

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

#### **V příbalové informaci naleznete:**

1. Co je **Candibene 1% spray** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **Candibene 1% spray** používat
3. Jak se **Candibene 1% spray** používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak **Candibene 1% spray** uchovávat
6. Další informace

### **1. CO JE Candibene 1% spray A K ČEMU SE POUŽÍVÁ**

Léčivá látka přípravku, klotrimazol, je antimykotikum pro kožní podání. Tlumí růst řady choroboplodných hub, včetně dermatofytů, kvasinek a plísní. Působí i na některé druhy bakterií.

**Candibene 1% spray** mohou používat dospělí, mladiství a děti od věku 2 let k léčbě infekcí kůže a nehtů, které jsou způsobeny choroboplodnými houbami, kvasinkami a plísněmi, a to zvláště infekcí nohou a kožních řas. Tyto infekce se mohou projevit zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou. Diagnózu těchto onemocnění vždy stanoví lékař, s nímž je třeba se poradit o vhodnosti používání přípravku **Candibene 1% spray**.

### **2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Candibene 1% spray POUŽÍVAT**

#### **Nepoužívejte Candibene 1% spray**

- jestliže jste precitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku;
- jestliže kojíte, nenanášejte přípravek na prsní bradavky.

Přípravek není určen pro děti mladší než 2 roky.

#### **Zvláštní opatření při použití přípravku Candibene 1% spray je zapotřebí**

- jestliže jste těhotná (zvláště v prvních 3 měsících) nebo kojíte. O vhodnosti používání přípravku se poradte s lékařem.

#### **Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky**