

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls182873/2010

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

CANESPOR 1X DENNĚ KRÉM

(Bifonazolum)

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer s.r.o., Praha , Česká republika

Výrobce

Kern Pharma, S.L.,

08228 Terrassa (Barcelona)

Španělsko

Složení 100 g krému obsahuje bifonazolum 1 g

Pomocné látky: benzylalkohol, cetyl-palmitát, cetylstearylalkohol , oktyldodekanol, polysorbát 60, sorbitan-stearát, čištěná voda

Indikační skupina Širokospektré antimykotikum

Charakteristika

Léčivá látka přípravku Canespor 1x denně, krém je lokální antimykotikum se širokým spektrem účinku k místní léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami, plísněmi a jinými houbami.

Bifonazol dobře proniká do kožních vrstev postižených infekcí a usmrcuje tam původce nákazy nebo brání jejich růstu.

Indikace

Canespor 1x denně se používá při plísněvých onemocněních (mykózách) vyvolaných dermatofyty, kvasinkami a jinými houbami. K nálezům citlivým na Canespor 1x denně patří například mykózy nohou a rukou (tinea pedum, tinea manus), mykózy kůže v místech snadného zapaření, t.j. především v kožních záhybech (tinea corporis, tinea inguinalis). Dalšími indikacemi jsou pityriasis versicolor (olupující se skvrny obvykle na přední straně trupu nebo na zádech), povrchové kandidózy (zřetelně ohraničené, obvykle červené svědicí skvrny, často se objevují v místech zapárky nebo mezi prsty), erythrasma (červenohnědé nesvědivé skvrny až plochy v místech vystavených zvýšenému pocení a tření).

Přípravek mohou užívat děti od 3 let a dospělí.

Kontraindikace

Canespor 1x denně se nesmí používat při přecitlivělosti na bifonazol nebo pomocné látky obsažené v přípravku. Při přecitlivělosti na cetylstearylalkohol se doporučuje místo krému použít jinou lékovou formu, např. Canespor 1x denně roztok, který tuto látku neobsahuje.