

Příbalová informace – VP

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ

Canifug- Lösung 1%

Kožní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Dr. August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, D-33611 Bielefeld Německo

Složení: 1 ml roztoku obsahuje :

Léčivá látka: clotrimazolum 0,01 g

Pomocné látky: makrogol 400, propylenglykol, isopropylalkohol

Indikační skupina: Antimykotikum

Indikace:

Léčba zánětů kůže způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida) a plísní houbami a jinými (např. rodu Malassezia furfur). Ty se mohou projevit jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, pityriasis versicolor, povrchová kandidóza.

Kontraindikace:

Kdy se nesmí Canifug - Lösung 1% použít?

Canifug - Lösung 1% se nesmí použít při přecitlivělosti na clotrimazol. Je-li známa přecitlivělost na makrogol 400 a propylenglykol nebo citlivost na isopropanol, doporučuje se místo roztoku použít nějakou formu léku bez těchto látek (např. krém).

Na co je třeba dávat pozor v době těhotenství a kojení?

Canifug - Lösung 1% se z opatrnosti nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1. - 3. měsíc), protože při jedné studii bylo upozorněno na zvýšený výskyt potratů při používání léčiva obsahujícího clotrimazol k léčbě infekcí v pochvě v prvních 3 měsících těhotenství.

Aby kojenec nepřijímal při kojení nepatrná množství účinných látek, nesmí se přípravek Canifug - Lösung 1% používat v době kojení na oblast prsou.

Na co je třeba dbát u dětí a starších osob?

Zvláštní úpravy léčby nejsou nutné, protože nejsou známy žádné zvýšené nebo zesílené vedlejší účinky při použití přípravku Canifug - Lösung 1%.

Interakce:

Které přípravky se vzájemně ovlivňují?

Kvůli působení účinné látky clotrimazolu snižuje Canifug - Lösung 1% účinnost amfotericinu a polyenantibiotik (nystatin, natamycin).

Upozorňujeme, že tyto údaje mohou platit také pro léky používané před nedávnou dobou.

Dávkování, způsob a doba použití:

Následující údaje platí, jestliže Vám lékař nedoporučí užívat Canifug - Lösung 1% jinak. Řiďte se podle návodu k používání, přípravek Canifug - Lösung 1% jinak nemá správný účinek.

Jak často a v jakém množství máte používat Canifug - Lösung 1%?

Přípravek Canifug - Lösung 1% nastříkejte 2-3krát denně v tenké vrstvě na postižená místa.

Při každém použití stiskněte stříkací ventil 1-2krát. Toto množství je na základě vynikající účinnosti dostačující i při velkoplošných plísníových onemocněních.

Jak máte používat Canifug - Lösung 1%?

Po nastříkání na postižená místa přípravek Canifug - Lösung 1% vmasírujte prsty do kůže.