

(ETIKETA NA LAHVIČCE JE SLOUČENA S PŘÍBALOVOU INFORMACÍ)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO UŽIVATELE

CYTEAL

kožní tekutina (pěnivá)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Cyteal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyteal používat
3. Jak se přípravek Cyteal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Cyteal uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CYTEAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cyteal je antiseptická, antibakteriální a fungicidní pěnivá tekutina, určená k zevnímu použití. Přípravek působí ničivě na bakterie, plísňe, zevně dezinfikuje. Používá se v gynekologii k čištění a dezinfekci kůže a sliznic (při vaginitidách – zánětech pochvy a vulvitidách – zánětech zevních pohlavních orgánů), v dermatologii (v kožním lékařství) při cílené léčbě kožních onemocnění (náchylných k infekci nebo již infikovaných – jako jsou akné, intertrigo - opruzení, kožní mykózy- plísňová onemocnění kůže, bércevé vředy) nebo v chirurgii k čištění a dezinfekci ran, k dezinfekci rukou. Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYTEAL POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Cyteal

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na {léčivou látku/léčivé látky} nebo na kteroukoli další složku přípravku Cyteal
- v místech blízko očí, protože přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s okem. Rovněž nepoužívejte do uší při podezření či perforaci (protržení) ušního bubínku.
- k dezinfekci kůže před úkony a odběry (odběr krve, aplikace injekčních roztoků, různé punkce) ani před invazivními úkony chirurgického charakteru jako jsou lumbální punkce, kanylace centrálních žil a podobně. Rovněž nepoužívejte k desinfekci zdravotního materiálu a chirurgických nástrojů!

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky