

Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls171320/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE

Šumivé tablety

acidum ascorbicum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Additiva Vitamin C Blutorange musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-Pokud se vaše příznaky zhorší, nebo se nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je **Additiva Vitamin C Blutorange** a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete **Additiva Vitamin C Blutorange** užívat
3. Jak se **Additiva Vitamin C Blutorange** užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak **Additiva Vitamin C Blutorange** uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organismu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kosti a pojivové tkáni. Zvyšuje fyzickou výkonnost a odolnost proti infekcím. Přípravek je určen k léčbě a pro předcházení nedostatku vitamínu C v organismu. Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, v těhotenství, a v období kojení a u dětí od 3 let věku. V době zvýšených nároků organismu u mladistvých a starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez lékařského předpisu podle doporučeného dávkování.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVAT

Neužívejte Additiva Vitamin C Blutorange

jestliže jste alergický/á na léčivou nebo na kteroukoli složku **Additiva Vitamin C**

Blutorange. Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů (zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kyselina askorbová mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou léky snižující krevní srážlivost, V-penicilin, železo, vitamin B12. Kyselina acetylosalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové. Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení glukózy v moči a test na neznatelné krvácení ve stolici).

Těhotenství a kojení

Přípravek může být používán i v těhotenství a při kojení. Poradte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách Additiva Vitamin C Blutorange

Tento přípravek obsahuje pomocnou látku azorubin, která může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UŽÍVÁ

Pokud lékař neurčí jinak, doporučuje se jednu šumivou tabletu denně, dětem od 3 let se podává polovina šumivé tablety denně po dobu 7-14 dní. Tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších jako jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové), může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat. Při případném výskytu jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

5. JAK ADDITIVA VITAMIN C BLUTORANGE UCHOVÁVÁT

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Additiva Vitamin C Blutorange nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje

Léčivá látka: Acidum ascorbicum 1,00 g v jedné šumivé tabletě.

Pomocnými látkami jsou: Kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, azorubin, indigokarmín.

Jak Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení

Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety

s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v tubě z plastické hmoty s pojistným uzávěrem a vysoušedlem.

Velikost balení: 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Bergisch Gladbach, Německo

Výrobce:

Dr.B. Scheffler GmbH, Bergisch Gladbach, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.8.2012