

**Příbalová informace –**

**Informace pro uživatele**

**Informace o použití, čtěte pozorně!**

**AJATIN PROFARMA tinktura**

kožní roztok

Benzododecinii bromidum

**AJATIN PROFARMA tinktura s mechanickým  
rozprašovačem**

kožní roztok

Benzododecinii bromidum

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Profarma-Produkt, s.r.o., Jablonec nad Nisou, Česká Republika

---

**Složení**

**Léčivá látka:**

Benzododecinii bromati solutio 10% 100g v 1000ml roztoku

**Pomocné látky:**

Ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť 311.

**Indikační skupina**

Antiseptikum a dezinficiens

**Charakteristika**

Ajatin je přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen pro vnější použití.

## **Indikace**

Přípravek je určen k dezinfekci běžných povrchových poranění pokožky. U závažných, hlubokých poranění je nutno rady lékaře. Přípravek mohou užívat dospělí i děti a mladiství.

## **Kontraindikace**

Přípravek se nesmí používat při známé přecitlivělosti na účinnou látku či pomocné látky a na látky stejné chemické skupiny.

## **Nežádoucí účinky**

Přípravek je obvykle dobře snášen, jen výjimečně se, u přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití, mohou na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity.

Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poradte s lékařem.

## **Interakce**

Účinky přípravku Ajatin a jiných současně používaných přípravků se mohou navzájem ovlivňovat. Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek. Není vhodná kombinace Ajatinu se silně oxidujícími látkami (např. peroxid vodíku).

## **Způsob použití**

Důkladně potřete pokožku plně prosáklým tampónem, po ošetření pokožky je třeba počkat do zaschnutí tinktury. U balení opatřených mechanickým rozprašovačem se přípravek aplikuje ze vzdálenosti 10 cm od plochy určené k dezinfekci.

## **Upozornění**

Při podráždění pokožky je nutno použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení. Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna.

Z pokožky se odstraňuje velmi dobře benzinalkoholem.

V případě kožního onemocnění se o užívání přípravku poraďte s lékařem.

## **Uchovávání**

Uchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Chraňte před mrazem.

Chraňte před mrazem (při nižší teplotě se tvoří sraženina).

.

## **Varování**

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Přípravek musí být uložen mimo dosah dětí.

## **Balení**

10ml tinktury

25ml tinktury

50ml tinktury

1000ml tinktury (pouze přípravek bez mechanického rozprašovače)

**Datum poslední revize: 31.3.2010**