

## **Příbalová informace: informace pro uživatele**

**Meteospasmyl**  
měkké tobolky  
alverini citras, simeticonum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat
3. Jak se Meteospasmyl užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Meteospasmyl uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je Meteospasmyl a k čemu se používá**

Meteospasmyl je kombinovaný přípravek obsahující alverin-citrát, látku tlumící bolestivé stahy střeva, a simetikon, který působí proti nadýmání a plynatosti. Po podání ústy vytvoří simetikon ochranný film na střevní sliznici a alverin postupně zmírní napětí stěny střevní.

Meteospasmyl se užívá bez porady s lékařem k léčbě příznaků funkčních střevních poruch, které se projevují pocitem plných střev, nadýmáním, zvýšenou střevní plynatostí. Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 7 dní.

Meteospasmyl je vhodný pro léčbu dospělých osob.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Meteospasmyl užívat**

##### **Neužívejte přípravek Meteospasmyl**

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže Váš lékař Vám řekl, že trpíte neprůchodností střev,
- pokud jste těhotná,
- když kojíte.

Meteospasmyl nesmí být podáván dětem a mladistvým do 18 let.

## **Upozornění a opatření**

- jestliže se u Vás objeví příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, příměs krve a hlenu ve stolici, zástava větrů a stolice, které mohou předcházet neprůchodnosti střev, nebo horečka či průjem, neužívejte Meteospasmyl a vyhledejte lékaře.

## **Další léčivé přípravky a přípravek Meteospasmyl**

Nebylo zaznamenáno žádné vzájemné ovlivnění účinku přípravku Meteospasmyl a účinku jiných léků. Nicméně informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

## **Přípravek Meteospasmyl s jídlem a pitím**

Meteospasmyl se užívá na začátku jídla.

## **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Meteospasmyl se neužívá v těhotenství a při kojení.

## **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Není známo, že by Meteospasmyl ovlivňoval schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje.

## **3. Jak se Meteospasmyl užívá**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle užívají dospělí 1 tobolku 2-3 krát denně. Tobolky se užívají na začátku jídla, polykají se nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Léčba bez lékařského dohledu smí trvat maximálně 7 po sobě následujících dní.

Denní dávka přípravku Meteospasmyl v průběhu léčby bez doporučení lékaře nesmí v žádném případě překročit 3 tobolky denně.

### **Jestliže jste užil(a) více přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a)**

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Meteospasmyl, než jste měl(a), vyhledejte lékaře.

### **Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Meteospasmyl**

Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu nebo více dávek, užijte příští dávku v obvyklý čas a pokračujte v obvyklém dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás při léčbě přípravkem Meteospasmyl vyskytnou příznaky jako otoky rukou, nohou, obličeje, rtů nebo hrdla, které Vám mohou způsobit potíže při polykání nebo dýchání, může se jednat o alergickou reakci. Může se také vyskytnout vyrážka nebo svědění. V případě výskytu těchto příznaků **přestaňte užívat přípravek Meteospasmyl a vyhledejte ihned lékaře.** Alergická reakce může vést až k šoku.

Při léčbě se vzácně (vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob) mohou objevit:

- sucho v ústech,
- nevolnost,
- bolesti hlavy,
- slabost,
- závratě,
- pokles krevního tlaku.

Vzácně byly hlášeny případy změn na játrech, které se upravily po přerušení léčby.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

## **5. Jak Meteospasmyl uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Meteospasmyl obsahuje**

- Léčivými látkami jsou alverini citras a simeticonum. Jedna měkká tobolka Meteospasmyl obsahuje 60 mg alverin-citrátu a 300 mg simetikonu.
- Dalšími složkami jsou želatina, glycerol 85%, oxid titaničitý.

### **Jak přípravek Meteospasmyl vypadá a co obsahuje toto balení**

Meteospasmyl jsou měkké želatinové krémově bílé tobolky obsahující bílou neprůhlednou masu.

Meteospasmyl měkké tobolky jsou dodávány v blistrovém balení po 20 tobolkách.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

6, avenue de l'Europe – B.P. 51

78 401 CHATOU CEDEX

FRANCIE

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována**

20.3.2013