

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro nemocného, čtěte pozorně!

ROWATINEX **Měkkétobolky**

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Irsko

SLOŽENÍ:

1 měkká tobolka obsahuje:

Léčivé látky

Pinenum α)	24,8 mg
Pinenum β	6,2 mg
Camphenum	15,0 mg
Cineolum	3,0 mg
Fenchonum	4,0 mg
Borneolum	10,0 mg
Anetholum	4,0 mg

Pomocné látky: Panenský olivový olej, želatina, glycerol 85%, sodná sůl ethylparabenu, sodná sůl propylparabenu, oranžová žluť E 110, chinolinová žluť E 104, čištěná voda

INDIKAČNÍ SKUPINA:

Antiseptika, desinficiencia

CHARAKTERISTIKA:

ROWATINEX je směs terpenů, která zvyšuje vylučování moče, zmírňuje křeče močových cest a umožňuje rozpad, rozpouštění a vyplavování ledvinových a močových kamenů. Je účinná při akutních a chronických zánětech močových cest a překrvením ledvin přispívá ke zvýšenému vylučování moči.

INDIKACE:

ROWATINEX se používá po poradě s lékařem k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Bez porady s lékařem je vhodný při ledvinových a močových kamenech u dospělých, kdy napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.

KONTRAINDIKACE:

Nejsou známy. Přípravky by neměly být podávány ženám v prvních 3 měsících těhotenství a po dobu kojení.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

ROWATINEX je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou jeho složku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce. Ve zcela ojedinělých případech byly popsány žaludeční obtíže a nevolnost. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

INTERAKCE:

ROWATINEX může ovlivňovat účinek léků používaných ke srážlivosti krve a léků, které jsou jsou metabolizovány v játrech nebo v ledvinách.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte ROWATINEX.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nedoporučí-li lékař jinak:

Dospělí: 3 až 4krát denně 1 tobolku před jídlem.

Děti od 6 do 14 let: 1 až 2krát denně 1 tobolku před jídlem. **UPOZORNĚNÍ:**

ROWATINEX obsahuje barvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce. ROWATINEX není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, se zástavou močení a tvorby moči a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.

Přípravek ROWATINEX je určen pouze k vnitřnímu užití.

V případě předávkování kontaktujte lékaře.

UCHOVÁVÁNÍ:

Při teplotě do 25°C.

VAROVÁNÍ:

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

BALENÍ:

20, 50 a 100 tobolek

DATUM POSLEDNÍ REVIZE: 2. 12. 2009