

**Informace pro nemocného, čtěte pozorně!**

**ROWATINEX**  
**Perorální kapky roztok**

**Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:**

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Irsko

**SLOŽENÍ:**

100 g roztoku obsahuje:

Léčivé látky

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pinenum $\alpha$ | 24,8 g |
| Pinenum $\beta$  | 6,2 g  |
| Camphenum        | 15,0 g |
| Cineolum         | 3,0 g  |
| Fenchonum        | 4,0 g  |
| Borneolum        | 10,0 g |
| Anetholum        | 4,0 g  |

Pomocné látky: Panenský olivový olej

1 ml roztoku odpovídá 26 kapkám

**INDIKAČNÍ SKUPINA:**

Antiseptika, desinficiencia

**CHARAKTERISTIKA:**

ROWATINEX zvyšuje vylučování moče, zmírňuje křeče močových cest a umožňuje rozpad, rozpouštění a vyplavování ledvinových a močových kamenů. Je účinný při akutních a chronických zánětech močových cest a překrvením ledvin přispívá ke zvýšenému vylučování moči.

**INDIKACE:**

ROWATINEX se používá po poradě s lékařem k léčbě akutních i chronických onemocnění močových cest, při zánětech a infekcích močových cest, ke zmírnění zejména kolikovitých křečí. Bez porady s lékařem je vhodný při ledvinových a močových kamenech, kdy napomáhá k jejich rozpadu, rozpouštění a vyplavování.

**KONTRAINDIKACE:**

Nejsou známy. Přípravky by neměly být podávány ženám v prvních 3 měsících těhotenství a po dobu kojení.

### **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:**

ROWATINEX je zpravidla velmi dobře snášen. U osob přecitlivělých na některou jeho složku se mohou objevit mírné alergické kožní reakce. Ve zcela ojedinělých případech byly popsány žaludeční obtíže a nevolnost. Při případném výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

### **INTERAKCE:**

ROWATINEX může ovlivňovat účinek léků používaných ke srážlivosti krve a léků, které jsou metabolizovány v játrech nebo v ledvinách.

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejně přípravky. Pokud vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte ROWATINEX.

### **DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB POUŽITÍ:**

Nedoporučí-li lékař jinak:

Dospělí: 4 až 5krát denně 3 až 5 kapek na kostku cukru nebo kousek sucharu před jídlem.

Děti od 6 do 14 let: 3 až 4krát denně 1 až 2 kapky na kostku cukru, kousek sucharu nebo piškotu před jídlem.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Přípravek ROWATINEX je určen pouze k vnitřnímu užití. K přesnému odměření dávky roztoku použijte vždy kapátko.

ROWATINEX není vhodný pro pacienty s těžkými a opakovanými kolikami, se zástavou močení a tvorby moči a při těžkých a recidivujících infekcích močových cest.

V případě předávkování kontaktujte lékaře.

### **UCHOVÁVÁNÍ:**

Při teplotě do 25°C. Po každém použití lahvičku dobře uzavřete.

### **VAROVÁNÍ:**

Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

### **BALENÍ:**

10 ml

**DATUM POSLEDNÍ REVIZE:** 2. 12. 2009