

**Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29145/2012****PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU****NÁZEV PŘÍPRAVKU****Šalvějová nat'**

Salviae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

**SLOŽENÍ**

Salviae herba 30 g

**POUŽITÍ**

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný *vnitřně*: mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné pocení

*Zevně*: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

**PŘÍPRAVA**

*Vnitřně*: *při zažívacích obtížích*: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*k omezení nadměrného pocení*: 1 polévková lžice se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*Zevně*: 1 polévková lžice drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně.

Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

*Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použije 1 polévková lžice na 120 ml vroucí vody.*

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, porad'te se s lékařem.

**KONTRAINDIKACE**

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

**NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřídte ani neobsluhujte stroje.

## **UPOZORNĚNÍ**

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje a je třeba poradit se s lékařem.

Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.

Nepoužívejte dlouhodobě.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

## **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**HMOTNOST** 30 g

**PN 05-02**

## **REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

94/926/97-C

## **EAN KÓD**

859 400 307 5186

## **ČÍSLO ŠARŽE**

## **POUŽITELNÉ DO**

## **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE**

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

## **UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM**

ŠALVĚJOVÁ NAŤ

## **DATUM REVIZE TEXTU**

6.2.2012