

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

### SICCAPROTECT

(Dexpanthenolum, alcohol polyvinylicus)

Oční kapky, roztok

**Vážená pacientko, vážený paciente,**

**čtěte, prosím, tuto informaci pozorně, protože údaje v ní obsažené jsou pro Vás důležité. Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.**

#### **Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce**

*Kdo je odpovědný za prodej a výrobu přípravku SICCAPROTECT?*

URSAPHARM spol. s.r.o., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

#### **Složení**

*Jaká je léčivá látka?*

Dexpanthenolum 30 mg, alcohol polyvinylicus 14 mg v 1 ml očních kapek ( 1 ml = 20 kapek).

*Co ještě přípravek SICCAPROTECT obsahuje*

Pomocné látky:

Benzalkonium-chlorid, dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan draselný, voda na injekci

#### **Indikační skupina:**

*Co je přípravek SICCAPROTECT?*

SICCAPROTECT jsou oční kapky, oftalmologikum, nahrazující chybějící tekutinu normálních slz.

*Jak působí přípravek SICCAPROTECT?*

Dexpanthenol, obsažený v přípravku, patří do skupiny vitaminů B. Je důležitý pro správný průběh látkové přeměny ve tkáních. Působí protizánětlivě, tiší pocit svědění a podporuje regeneraci rohovky i spojivek. Poškození těchto tkání, vyvolané nedostatkem slz, se účinkem dexpanthenolu rychle upraví a trvalé užívání přípravku zamezí vzniku dalších poruch. Dexpanthenol mimoto váže vodu a i to spolupůsobí při zvlhčování spojivkového vaku. Zejména u starších lidí nemusí být denní potřeba dexpanthenolu vždy dostatečně pokryta jeho příjmem v potravě.

Polyvinylalkohol, obsažený v přípravku, zvyšuje vazkost (přilnavost) očních kapek a tak umožňuje vytvořit dlouhodoběji působící ochranný povlak.

Stupeň kyselosti i vazkost přípravku odpovídá poměrům v normální slzné tekutině; SICCAPROTECT tak působí jako náhrada slz.

## Indikace

*Proč se užívá přípravek SICCAPROTECT?*

SICCAPROTECT se užívá k úpravě stavu při vysychání rohovky nebo spojivek při nedostatečné tvorbě slz, ať již tento nedostatek tvorby byl způsoben místními poruchami v oku anebo jako následek celkových onemocnění; také se používá při vysychání spojivkového vaku, vyvolaném nedovíráním víček. - Mimoto se SICCAPROTECT používá také ke zvlhčování oka při nošení tvrdých kontaktních čoček. Umělé slzy bývá většinou nutné používat doživotně.

Přípravek je určen pro děti i dospělé; děti však trpí poruchami tvorby slz zcela výjimečně.

Ačkoliv přípravek lze užívat i bez lékařského předpisu, vždy se nejdříve o jeho užívání poraďte se svým očním lékařem, který by rovněž tak měl být informován o podávání přípravku dítěti.

## Kontraindikace

*Kdy byste neměl(a) užívat přípravek SICCAPROTECT?*

SICCAPROTECT nepoužívejte při přecitlivělosti vůči kterékoli složce přípravku a pro obsah benzalkonia jej **nesmíte použít, nosíte-li měkké kontaktní čočky.**

## Nežádoucí účinky

*Jaké nežádoucí účinky může přípravek SICCAPROTECT způsobit?*

Zřídka se mohou objevit příznaky přecitlivělosti s pocitem mírného pálení ve spojivkovém vaku.

*Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?*

Pokud by se objevily nežádoucí anebo neobvyklé účinky, informujte o tom, prosím, svého lékaře.

## Interakce

Účinky přípravku SICCAPROTECT a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat. Než začnete současně s užíváním přípravku SICCAPROTECT užívat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Interakce přípravku SICCAPROTECT dosud nejsou známy.

## Upozornění

*Co musíte vzít v úvahu při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů?*

SICCAPROTECT tyto schopnosti neovlivňuje; po dobu 20 minut po vkápnutí do oka však může přetrvávat mírně neostře vidění.

V průběhu léčby přípravkem SICCAPROTECT by neměly být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého uvolňování z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky.

*Co musí vzít v úvahu těhotná nebo kojící žena?*

V období těhotenství i kojení se o používání přípravku SICCAPROTECT poraďte s lékařem.

## **Dávkování**

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod k použití - jinak Vám přípravek SICCAPROTECT nepřinese plný prospěch!

*Jaké množství přípravku SICCAPROTECT máte užívat a jak často?*

Obvykle se vkápne po jedné kapce přípravku až šestkrát denně do spojivkového vaku.

*Jak a kdy máte užívat přípravek SICCAPROTECT?*

Odšroubujte ochrannou čepičku, mírně zakloňte hlavu, odtáhněte dolní víčko, obraťte lahvičku dnem vzhůru a stlačením plastické lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku přípravku. Při tom dávejte pozor, abyste se nedotkl oka ani víčka. Oko velmi pomalu zavřete. - Ihned po použití lahvičku opět dobře uzavřete.

*Jak dlouho máte přípravek SICCAPROTECT užívat?*

Přípravek SICCAPROTECT se obvykle musí užívat dlouhodobě, často po celý život.

*Co máte udělat, když jste užil(a) příliš velikou dávku přípravku SICCAPROTECT?*

Přípravek je nejedovatý, buďte bez obav. Vypije-li lahvičku přípravku SICCAPROTECT omylem dítě, navštivte lékaře.

*Co byste měl(a) udělat, kdybyste omylem vynechal(a) dávku? V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání předchozí dávky.*

## **Uchovávání**

*Při jaké teplotě můžete uchovávat přípravek SICCAPROTECT po otevření?*

Přípravek SICCAPROTECT uchovávejte při teplotě do 25 °C.

## **Varování**

*Při léčbě přípravkem SICCAPROTECT dodržujte laskavě tato pravidla:*

Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

## **Balení:**

1 kapací lahvička s 10 ml roztoku

3 kapací lahvičky po 10 ml roztoku

## **Datum poslední revize příbalové informace**

*Kdy byla tato informace schválena?*

16.12.2009

**Máte-li jakékoli další otázky, porad'te se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.**