

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE - VP

### Informace pro použití, čtěte pozorně!

#### DITUSTAT

(Dropropizinum)

Perorální kapky, roztok.

#### Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

TEVA Czech Industries s.r.o., Opava - Komárov, Česká republika

#### Složení

##### Léčivá látka:

Dropropizinum 22 mg v 1 ml (1ml = 26 kapek) roztoku.

##### Pomocné látky:

Badyánková silice, silice máty peprné, polysorbát 80, monohydrát kyseliny citronové, monohydrát sodné soli sacharinu, kyselina sorbová, čištěná voda.

#### Indikační skupina

Antitusikum.

#### Charakteristika

Nekodeinové antitusikum odpovídající silným antitusickým účinkem působení kodeinových přípravků. Jen minimálně ovlivňuje dechové centrum. Jeho současný antihistaminový účinek může příznivě ovlivnit i kašel alergického původu. Obsah solubilizovaných silic z anýzu a máty peprné podporuje expektorační účinek přípravku.

#### Indikace

Ditustat tlumí dráždivý, neproduktivní kašel při zánětech hrtanu, akutních i chronických zánětech dýchacích cest, pneumotoraxu a krvácení z dýchacích cest různého původu.

Přípravek je určen pro dospělé i děti od 6 měsíců.

#### Kontraindikace

Lék nesmí být podáván pacientům s přecitlivělostí na dropropizin, pacientům s onemocněním spojeným se zvýšenou produkcí hlenu v dýchacích cestách nebo se zhoršenou funkcí sliznic (Kartagenerův syndrom, ciliární dyskinesie)

Lék nesmí užívat těhotné a kojící ženy a děti do 6 měsíců.

U pacientů s těžkým poškozením jater nebo ledvin musí být pro podání Ditustatu zvlášť závažné důvody.

### **Nežádoucí účinky**

Nežádoucí účinky nejsou časté. Může se vyskytnout nevolnost, zvracení, pálení žáhy, poruchy zažívání, průjem, slabost, ospalost, zmatenost, bolesti hlavy a bušení srdce.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcích se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem

### **Interakce**

Interakce nejsou dosud známy. Opatrnosti je třeba dbát při užívání sedativ pro možnost zesílení sedativního účinku. Není vhodné kombinovat Ditustat s jinými léky proti kašli bez porady s lékařem. Při předepisování jiných léků lékařem oznamte, že užíváte Ditustat.

### **Dávkování a způsob použití**

*Děti:*

<b>Věk dítěte</b>	<b>Odpovídající dávka</b>
6-12 měsíců	6 kapek 3-4krát denně
1-3 roky	13 kapek 3-4krát denně
3-13 roků	26 kapek 3-4krát denně

*Větší děti a dospělí:* 52 kapek 3-4krát denně nebo 25 kapek 6-8krát denně.

### **Způsob podání**

Kapejte z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru. Nakapejte na lžičku nebo do menšího množství tekutiny. Po užití zapijte vodou nebo ovocnou šťávou. Nejvhodnější je užívat lék asi půl hodiny před jídlem.

### **Upozornění**

Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře.

Přípravek má mírně nepříznivý vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů, proto by tyto činnosti neměly být vykonávány bez porady s lékařem.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

### **Uchovávání**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

**Varování**

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

**Balení**

10 ml, 25 ml a 50 ml.

**Registrační číslo**

36/223/80-C

**Datum poslední revize**

30.12.2009