

Příbalová informace: Informace pro uživatele

ICHTOXYL

mast

Ichthammolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V této příbalové informaci najdete:

- 1.Co je Ichtoxyl a k čemu se používá
- 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ichtoxyl používat
- 3.Jak se přípravek Ichtoxyl užívá
- 4.Možné nežádoucí účinky
- 5.Jak přípravek Ichtoxyl uchovávat
- 6.Další informace

1. CO JE ICHTOXYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Ichtoxyl?

Ichtoxyl obsahuje léčivou látku ichthammolum 2.7 g ve 30 g masti.

Ichtoxyl je mast pro zevní použití na kůži k léčbě infekčních a hnisavých kožních onemocnění, při drobných infikovaných poraněních a plísňových onemocněních, u omrzlin, proleženin, u počínajícího nežítu a při trudovině (akné).

Ichtoxyl mast obsahuje jako hlavní účinnou látku léčebný dehet ichthamol. Ichthamol působí protisvědivě, protizánětlivě, snižuje tvorbu mazu (působí antiseboroicky), má mírný dezinfekční účinek, zvyšuje kožní prokrvení.

Perboritan sodný, oxid vápenatý a síran hlinito-draselný působí mírně dezinfekčně, protisvědivě a mají mírný stahující účinek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT ICHTOXYL

Přípravek Ichtoxyl se nesmí užívat

- pokud jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo některou z pomocných látek;
- při akutním dráždivém zánětu kůže
- při akutním ekzému
- na sliznice a do očí

Zvláštní opatrnosti při užívání Ichtoxylu je zapotřebí

Při použití Ichtoxylu na rozsáhlejší plochy poškozené kůže (při proleženinách apod.) se o způsobu používání Ichtoxylu a délce léčby poradte s lékařem.

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. V této situaci je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinek Ichtosyl masti a účinky jiných současně používaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Ichtosyl.

Ichtosyl mast se nesnáší s řadou látek, např. s jodem. Účinná látka ichthamol může zvýšit účinnost některých kožních léků, např. přípravků s obsahem kortikosteroidních hormonů, chloramfenikolu a heparinu. Proto není vhodné nanášet na stejné místo současně s Ichtosylem jiné přípravky pro místní použití.

Z těchto důvodů nepoužívejte bez porady s lékařem pro své onemocnění současně s touto mastí jiné léky pro místní používání.

Užívání přípravku Ichtosyl s jídlem a pitím

Použití léku Ichtosyl není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání přípravku Ichtosyl není jídlem ani nápoji ovlivněn.

Těhotenství a kojení

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtosyl pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ichtosyl

Přípravek obsahuje lanolin, nepoužívejte Ichtosyl pokud jste přecitlivělí na lanolin.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UŽÍVÁ?

Ichtosyl mast je možno používat bez porady s lékařem na trudovinu (akné) a na drobná infikovaná poranění. O vhodnosti použití masti při jiných onemocněních se poradte s lékařem.

Jestliže lékař neurčí jinak, je obvyklé použití Ichtosylu:

U dospělých se mast nanáší v tenké vrstvě 2 – 3krát denně na postižená místa. Děti starší než 1 roka těhotné nebo kojící ženy mohou používat Ichtosyl mast pouze na doporučení lékaře. O způsobu použití Ichtosylu u dětí se poradte s lékařem.

Mast je rovněž možno nanést na gázu, přiložit na postiženou plochu a opatřit obvazem.

Délka léčby je různá, v závislosti na druhu, rozsahu a rychlosti hojení onemocnění. Nedojde-li při léčbě Ichtosylem k ústupu obtíží během 3 dnů nebo dojde-li naopak k jejich zhoršení, poradte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Přípravek nepoužívejte bez vědomí lékaře déle než 2 týdny.

Místa ošetřená Ichtosylem není vhodné vystavovat slunečnímu záření.

Při nanášení přípravku na nechráněnou pokožku může dojít k zašpinění prádla.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ichtosyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:

Velmi časté: více než 1 z 10 léčených osob.

Časté: méně než 1 z 10, avšak více než 1 ze 100 léčených osob.

Méně časté: méně než 1 ze 100, avšak více než 1 z 1000 léčených osob.

Vzácné: méně než 1 z 1000, avšak více než 1 z 10000 léčených osob.

Velmi vzácné: méně než 1 z 10000 léčených osob, včetně ojedinělých případů.

Nežádoucí účinky:

Méně časté: místní reakce jako je svědění, pálení nebo zčervenání kůže, které jsou jen lehké a přechodné povahy. Obvykle jsou tyto projevy výsledkem bezprostředního podráždění, záhy pominou a není třeba léčeni přerušit. Při pochybnostech je vhodné poradit se neprodleně s ošetřujícím lékařem.

Vzácné: příznaky přecitlivělosti zahrnující zduření kůže a výsevy drobných pupínků

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím přerušete léčbu a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ICHTOXYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 10 - 25 °C, v suchu.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje ICHTOXYL

Léčivá látka je ichthammolum 2,7 g v 30 g masti.

Pomocné látky: perboritan sodný, oxid vápenatý, síran draselno-hlinitý, tuk z ovčí vlny (lanolin), žlutá vazelína, čištěná voda

Jak přípravek ICHTOXYL vypadá a co obsahuje toto balení

Mast hnědočerné barvy, konzistence vazelíny, charakteristického zápachu po ichtamolu, v hliníkové tubě s plastovým šroubovacím uzávěrem.

Ichtoxyl je dostupný v balení 30 g.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Herbacos Recordati, s.r.o.

Štrossova 239, 530 03 Pardubice

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

2.3.2010